Les valeurs du *Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser.*

Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser

Generalitat de Catalunya

Les étangs de Puig Sec

Les prairies à la crête de la montagne de Fabert présentent un ensemble de petits étangs liés aux activités agricoles. Ces étangs jouent un rôle très important pour les écosystèmes et la biodiversité de ce site.

Ces étangs profitent aux troupeaux domestiques mais aussi à la faune sauvage qui y trouvent refuge, aliments et site de reproduction. C'est le cas par exemple de la grenouille rousse (*Rana temporaria*) et de certaines espèces d'odonates (demoiselle et libellules), qui ont besoin de zones-humides pour pondre leurs œufs ainsi que pour le développement de leurs larves.

La faune sauvage s'abreuve dans ces étangs qui se situent sur la route migratoire de nombreux oiseaux.
Une particularité du site est la présence d'un petit crustacé du nom scientifique de *Chirocephalus diaphanus*. Cette minuscule crevette, d'un peu plus d'un centimètre de longueur avec un corps transparents, est présente durant la saison en grandes concentrations à l'intérieur des eaux saumâtres. Leurs cycle vitale est très bref, juste le temps pour se reproduire et pondre leurs œufs. Dans le cas où les étangs s'assèchent, les œufs peuvent y rester quelques mois et éclore au remplissage de l'étang.

Quand ces étangs temporaires s'assèchent, se forment des tourbières constituées de boue facilement reconnaissables par l'apparition de touffes herbeuses dont on distingue parmi le genre *Carex*, une espèce de la péninsule ibérique *Carex cespitosa* qui se trouve seulement dans la zone oriental du *Parc Natural* et dans la région de *Bortziri* une *comarca* de Navarre.

Grenouille rousse (*Rana temporaria*)
Photographie: Mario Cobler

Les zones pastorales

Le paysage d'aujourd'hui est le résultat des activités humaines présentes depuis des millénaires.
Les prairies situées en-dessous de 2000 mètres d'altitude sont nombreuses dans le *Parc Natural*. Ces espaces ouverts résultent de la coupe d'essences forestière comme le chêne dans les parties basses, et le pin à crochets dans les parties plus élevées. Depuis plus de 6000 ans, les éleveurs brulent et coupent la forêt pour ouvrir des espaces qui favorisent l'apparition d'espèces herbacées et ainsi optimiser l'alimentation de leurs troupeaux.

Les prairies de l'étage montagnard comprises entre 1.800 et 1.200 mètres d'altitudes, servaient de pâturage temporaire pour les troupeaux qui descendaient des estives en passant par *Sant Miquel* en direction des pâturages d'hiver de la plaine et du littoral.

Aujourd'hui, à cause de la disparition des troupeaux d'ovins, ces prairies sont en régression et se referment par l'apparition d'arbustes et de plantes ligneuses peu productif pour les troupeaux.

Route migratoire

À chaque automne et à chaque printemps des millions d'oiseaux en migration sont en route entre l'Europe et l'Afrique. La migration se révèle comme une stratégie pour l'avifaune qui se déplace entre les zones de reproduction et les zones d'hivernation (et inversement). Au printemps il s'agit de la migration prénuptial, les oiseaux se déplacent du sud au nord. À l'inverse, durant l'automne, les déplacements s'effectuent du nord au sud.

Pour réaliser ces déplacements, les oiseaux choisissent le trajet le plus économique en énergie. Pour traverser les montagnes, comme les Pyrénées, ils recherchent les cols les plus accessibles entre les sommets de montagne. C'est pour cette raison, que le coll d'Arès constitue un passage migratoire. Les espèces d'oiseaux les plus facile à observer en migration au coll d'Arès, sont les rapaces, comme le circaète jean-le-blanc, la bondrée apivore ou le milan noir.

Milan royal (*Milvus milvus*)
Photographie: Thomas Kraft (https://commons.wikimedia.org/wiki/User:ThKraft)

El pi roig

Le nom de *pi roig* (Pinus silvestris), aussi nommé *pi rajolet*, vient de la couleur de l'écorce, un orange intense en haut du tronc et plus grenat en bas.

C'est un conifère à croissance rapide, jusqu'à 6 mètres en 10 ans, si les conditions environnementales (pluies et insolation) et les caractéristiques du sol (humide, profond et fertile) sont optimales. Ils peuvent atteindre 40 mètres de hauteur. Il résiste à la sécheresse et aux hivers très froids. Pour ces raisons, c'est l'espèce la plus utilisée dans les Pyrénées et Pré-Pyrénées, pour l'exploitation forestière.

La floraison a lieu de mai à juin, les pommes de pin, qui peuvent rester sur l'arbre pendant un an ou deux, mûrissent à l'automne. Cependant, les pignons ne sont fertiles que lorsque l'arbre a 40 ans.

Unió Europea
Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural
Europa inverteix en les zones rurals

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat

Ajuntament de Molló

Disseny i fotografia: Associació CEA Alt Ter - www.alt-ter.org